

IVOMAS 3.5%

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-6565-044

Solución inyectable

Endectocida de larga duración.

FÓRMULA: Cada 100 ml contienen:

Ivermectina	3.5 mg
Vehículo, c.b.p.	100 ml

DESCRIPCIÓN:

Es una solución estéril de Ivermectina al 3.5%, eficaz para el control y tratamiento de endoparásitos y ectoparásitos en bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.

INDICACIONES:

Para el control y tratamiento de gusanos redondos (gastrointestinales y pulmonares), así como ectoparásitos, moscas, piojos y ácaros de la sarna. Está indicado también en la prevención de gusaneras del ombligo de los becerros recién nacidos y de las heridas por castración. IVOMÁS 3.5% se indica para el control de diversos parásitos internos y externos como: Parásitos gastrointestinales (formas adultas y cuarto estadio larvario) incluyendo: *Ostertagia ostertagi* (incluso formas inhibidas). *O. lyrata*, *Haemonchus contortus*, *H. placel*, *Trichostrongylus axei*, *Cooperia pectinata*, *Cooperia oncophora*, *Cooperia punctata*, *Bunostomum phlebotomum*.

Parásitos pulmonares: *Dictyocaulus viviparus*.

Control y tratamiento de ectoparásitos: **Moscas**: estadio larvario de *Dermatobia hominis*, *Hypoderma bovis*, *Hypoderma lineatum*, y moscas chupadoras. **Piojos**: *Linognathus vituli*. **Ácaros de la sarna**: *Psoroptes communis var, bovis*, *Sarcoptes scabiei var, bovis*, *Chorioptes bovis*.

DOSIS:

Bovinos: 1 ml por cada 50 Kg de peso. (0.63 mg/kg de peso)

Nota: La dosis y su frecuencia pueden variar a criterio del MVZ.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Por vía subcutánea en el área de la escápula (paleta) o en el cuello.

SEGURIDAD AMBIENTAL:

Los estudios indican que cuando la ivermectina entra en contacto con el suelo, se fija rápida y firmemente a él, proceso que la inactiva. Los frascos vacíos deben distribuirse de forma segura (por ejemplo, incinerándolos o enterrándolos) ya que la ivermectina libre puede afectar de forma adversa a peces u otros organismos acuáticos.

COMPATIBILIDAD:

No interviene con la inmunidad de los animales tratados, el producto puede ser administrado simultáneamente con vacunas.

PERIODO DE RETIRO:

Los animales cuya carne se destina a consumo humano, sólo podrán ser sacrificados después de 122 días de la fecha de tratamiento. No usar

ADVERTENCIAS:

Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase alejado de alimentos y bebidas. No debe de administrarse por vía intravenosa. Lávese las manos después de manipular el producto. Manténgase en un lugar fresco y seco, y protegido de la luz solar. Este producto no deberá ser usado para el tratamiento de infestaciones por garrapatas *Boophilus spp.*

Los organismos acuáticos son altamente sensibles a la toxicidad de la ivermectina, por lo cual los recipientes vacíos y cualquier contenido residual deben ser desechados en forma segura, enterrándolos o incinerándolos.

PRESENTACIONES:

Frascos de 100 y 500ml.

Consulte al Médico Veterinario.