

# **DIPEN F**

## **FÓRMULA:**

Cada ml contienen:	
Penicilina G procaína	200,000 U.I
Dihidroestreptomocina sulfato equivalente a de la base	250.00 mg
Flumetazona	0.0625 mg
Vehículo c.b.p.	1.00 ml

## **DESCRIPCIÓN:**

Dipen F, es una potente combinación sinérgica de antibiótico corticoesteroide, diseñado para la acción inmediata de los componentes de la fórmula.

## **INDICACIONES:**

Infecciones bacterianas mixtas, agudas o crónicas, producidas por gérmenes gramnegativos y grampositivos, susceptibles a la penicilina y dihidroestreptomocina. Está indicado como terapia básica de las enfermedades como son: metritis, mastitis, neumonías, pasteurelosis, tonsilitis, gurma e infecciones asociadas a heridas traumáticas y en las profilaxis pre y post-operatorias.

## **DOSIS:**

Bovino:	2 a 2.5 ml por cada 50 Kg. de peso.
Equinos:	2 a 2.5 ml por cada 50 Kg. de peso.
Porcinos:	1 a 1.5 ml por cada 10 Kg. de peso.
Ovinos:	1 a 1.5 ml por cada 10 Kg. de peso.
Caprinos:	1 a 1.5 ml por cada 10 Kg. de peso.
Pequeñas especies:	0.5 ml por cada 5 Kg. de peso.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Intramuscular.

## **VENTAJAS DEL DIPEN F:**

- Proporciona pronta recuperación por la acción sinérgica de sus componentes que actúan inmediatamente.
- Inhibe el desarrollo del proceso inflamatorio.
- La flumetazona facilita la acción del antibiótico.
- La estabilidad del producto esta garantizada.
- Se absorbe y distribuye rápidamente en todo el organismo.

## **ADVERTENCIAS:**

No se use este producto 30 días antes del sacrificio de los animales destinado para consumo humano. No utilizar para consumo humano la leche procedente de animales tratados con este producto, hasta 3 días después de la última aplicación. Una vez reconstituido a temperatura ambiente es estable por 30 días y en refrigeración hasta 90 días.

## **PRESENTACIONES:**

Frasco de: 20 ml (4Millones)

Reg. S.A.G.A.R.P.A Q-6565-001  
**Suspensión inyectable**  
Antibiótico antiinflamatorio.

